



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

[返回首页](#)
q.yiban.cn

1

基本信息

2

配置样式

3

完成

创建轻应用

模块管理 通用组件 功能组件

防艾先破误区，科

防艾同心，生命同

签名墙

模块

模块

模块

模块

模块

模块

模块

模块

模块

模块

模块

点击小眼睛,添加新模块!



防艾先破误区，科学护健康

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样



防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

[返回首页](#)
q.yiban.cn

创建全国**禁毒示范城市**
共建共治共享美丽

贵阳市禁毒委

12月1日是第38个“世界艾滋病日”。日前，联合国艾滋病规划署发布报告显示，当前全球仍有4080万中920万人还未获得治疗，2024年全球新增感染病例130万例。

关于艾滋病，有很多认知误区，比如“与艾滋病人共用餐具会被感染”“只有性接触才会传播HIV病毒”
随着许多误解和谣言。这些错误观念不仅加深了人们对艾滋病的恐惧，也使得感染者在社会中承受了不
我们一起了解艾滋病科普知识，科学防艾，不再恐艾。

什么是艾滋病?



艾滋病，又称获得性免疫缺陷综合征（AIDS），是由人类免疫缺陷病毒，也就是我们常说的HIV病毒感染经由性行为、血液接触或母婴接触传播。

点击小眼睛,添加新模块!

退出

[上一步](#)

保存

预览网站样式

预览手机样



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙



目前尚无艾滋病的根本治愈方法，但抗病毒治疗可以有效控制病毒，使患者可以过上相对健康的生活，延长寿命。

一旦感染HIV就注定会发展成艾滋病？



不是每个HIV感染者都会发展成艾滋病，及时接受抗病毒治疗，保持健康的生活方式和监测病情系统致

[返回首页](#)
q.yiban.cn

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样

模块管理 通用组件 功能组件

点击小眼睛,添加新模块!



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

🏠 返回首页
q.yiban.cn

HIV感染的三个阶段↓



急性感染期：HIV急性病毒感染后，可能出现发热、咽痛、恶心、关节痛等症状，持续1~3周不等。这时常称为窗口期，大约在感染10天后可以检测出HIV核酸。这时往往容易忽视这些症状，误认为是“普通感的高危人群需尽快进行HIV相关检测。

无症状期：即在急性感染期以后，许多HIV感染者可能长时间内没有明显症状，被称为无症状期。在此期间。

艾滋病期：如果未接受治疗，HIV感染最终可能会发展成艾滋病。艾滋病是免疫系统功能受损严重的状态病和恶性肿瘤。

每个人的免疫系统和病毒反应都不同。有些人可能在多年后才发展成艾滋病，而有些人可能在感染后快速间跨度因人而异。

模块管理 通用组件 功能组件



点击小眼睛,添加新模块!

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

[返回首页](#)
q.yiban.cn

式



总之，HIV感染并不意味着一定会发展成艾滋病。及时接受抗病毒治疗、保持健康的生活方式、遵循医疗建议都可以帮助患者延缓或避免进展到艾滋病阶段。

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样

模块管理 通用组件 功能组件

点击小眼睛,添加新模块!



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

返回首页
q.yiban.cn

PEP——关键时刻的“救命稻草”

模块管理 通用组件 功能组件

HIV暴露后预防是指尚未感染HIV的人员，在暴露于高感染风险后，及早（不超过72小时）服用特定的抗险的方法。

常被人们称为“后悔药”的，就是**艾滋病病毒暴露后预防疗法（简称PEP）**。需要注意的是：这个“后悔药”**无法让已感染的人痊愈**，只可以保护未感染的人；和HIV感染者或感染状态不明者发生关系均可保护；必须在72小时内服用（暴露后2小时内服药最佳）。

贵阳禁毒温馨提示

关于艾滋病的几个常见误区

艾滋病会通过握手或拥抱传播吗？

不会

HIV主要存在于艾滋病患者和HIV感染者的血液、精液、阴道分泌物、乳汁等体液中。完整的皮肤能够阻挡病毒，只要皮肤没有破损，接触到艾滋病患者体表正常的汗液等分泌物是不会感染艾滋病的。

蚊子叮咬会传播艾滋病吗？

不会

血液中的HIV会在蚊子的消化系统中被灭活。另外，蚊子口器上残留的血液量极少，所携带的病毒数量远不足以感染。

HIV阳性母亲一定会把病毒传给孩子吗？

不一定

在没有任何干预措施的情况下，母婴传播的概率大约为15%-45%。而通过有效的母婴阻断措施，包括孕晚期服用抗病毒药物、剖宫产分娩方式和避免母乳喂养，母婴传播的风险可以降低到2%以下。

与艾滋病病人共用餐具会感染艾滋病？

点击小眼睛,添加新模块!

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

返回首页
q.yiban.cn

不会

HIV病毒一旦脱离体液环境，它的存活和感染能力都会大幅下降。因此，即使针头沾有HIV感染者的血液，露在外界环境中，感染的可能性几乎为零。

与艾滋病病人共用游泳池或公共浴室会感染艾滋病吗？

不会

在游泳池的水中或公共浴室的环境中，由于水的稀释作用、消毒剂的存在（游泳池水通常含有消毒剂）以及H值等），HIV病毒很难长时间存活。同时，人体的皮肤是一道天然的、非常有效的防护屏障，HIV病毒无法侵入人体。

所以与艾滋病患者共用游泳池或公共浴室不会感染艾滋病。

来源：央视新闻、视觉中国、贵州禁毒

模块管理 通用组件 功能组件



点击小眼睛,添加新模块！

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

[返回首页](#)
q.yiban.cn



退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样

模块管理 通用组件 功能组件

点击小眼睛,添加新模块!




【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

 返回首页
q.yiban.cn



防艾同心，生命同行



社会共治，守正创新，终结艾滋



珍爱生命，远离毒品

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样

模块管理 通用组件 功能组件

点击小眼睛,添加新模块!



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

返回首页
q.yiban.cn

式

签名墙

模块管理 通用组件 功能组件



点击小眼睛,添加新模块!

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样



【易·宣传】防艾不缺席，健康不缺席

防艾先破误区，科学护健康

防艾同心，生命同行

签名墙

式

签名墙 活动标语

易友97774463

模块管理 通用组件 功能组件



点击小眼睛,添加新模块!

[返回首页](#)
q.yiban.cn

退出

上一步

保存

预览网站样式

预览手机样